PORTABLE INSPIRATORY FLOW METER

CE 0120

CLEMENT CLARKE INTERNATIONAL



en

Introduction
The In-check is a portable inspiratory flow meter for measuring either oral or nasal inspiratory flow. It is intended for patient use as a simple way to monitor inspiratory flow rates, providing valuable information about the degree of obstruction or restriction within air passages. It can also be used in the assessment of technique for inhaled medication.
By breathing in through the In-check, a cursor moves along the scale to indicate the inspiratory flow. The flow rate achieved can be noted by checking the position of the cursor against the calibrated scale.

Application
The In-check can be used to measure either peak or sub-maximal inspiratory flows. The transparent body enables a qualitative view of the inspiratory manoeuvre.
For the measurement of nasal inspiratory flows it is necessary to attach a face mask.
For oral inspiratory flows, a clean mouthpiece (standard or filter type) should be used for each patient. The In-check should be cleaned in accordance with the instructions.
To reset the In-check hold the instrument vertically with the mouthpiece uppermost so the rounded end of the meter can be tapped gently from underneath with your hand. The magnetic resetting weight will be dislodged and will return the cursor to a start position. When this has happened, invert the meter to return the magnetic weight to its resting position.

Instructions
A low-resistance Bacterial/Viral filter can be used to minimise risk of cross infection.

a) For oral peak inspiratory flows:
The patient should be asked to:
1. Exhale fully
2. Hold the In-check horizontally with the lips sealed around the mouthpiece. A nose clip can be used to block off the nostrils
3. Inhale sharply and forcibly

The inspiratory flow should be noted and the In-check reset as described above.
The peak inspiratory flow should be measured three times and the highest result recorded.

b) For oral sub-maximal inspiratory flows (inhaler training):
The patient should be asked to:
1. Exhale
2. Hold the In-check horizontally with lips sealed around the mouthpiece.
3. Inhale in a slow controlled fashion

By advising the patient to inhale more or less forcibly, a described flow rate can be achieved.

c) For peak nasal inspiratory flows:
The patient should be asked to:
1. Exhale fully
2. Hold the In-check horizontally, and insure the face mask forms an air-tight seal around the nose
3. Inhale forcibly through the nose

The peak nasal inspiratory manoeuvre should be a short, sharp inspiratory action of about one second duration.
The inspiratory flow should be noted and the In-check reset as above.
The peak nasal inspiratory flow test should be repeated three times and the highest result recorded in the patient's records.

Note: *Spectacles should be removed. The mouth must be closed.*
Care should be taken to ensure that the mask forms an airtight seal against the face. Different masks may be available in a variety of sizes to suit different facial shapes. The mask should be disinfected between patients to avoid the risk of cross infection.

Peak Inspiratory Flow Measurement
Peak Inspiratory Flow (PIF) is one of a multitude of spirometric measurements. PIF is generally measured on large spirometric machines and has not therefore been the subject of extensive serial home monitoring.
The In-check meter makes this prospect a reality and opens the door to a greater understanding of PIF.

Applications of Oral Inspiratory Flow Measurement
Measurements of sub-maximal inspiratory flows are valuable when training patients in the correct use of medical inhaler devices. Recent studies have indicated target inspiratory flows for many of the inhaled medication devices commonly used to deliver medication in respiratory diseases.
Feedback to the patient from In-check measurement enables the patient to adjust their inhalation technique to best suit their own inhaler.

Applications of Peak Nasal Inspiratory Flow Measurement (PNIF)
1. Diagnosis of nasal obstruction
In some patients who complain of nasal obstruction, nasal airway patency is quite normal, and the symptom is due to consciousness of some other abnormality of the nasal cavity such as a prominent turbinate. In other cases, surprisingly low readings are obtained in some patients who are unaware of nasal obstruction, because they have got used to it. Quiet breathing through the nose can in such cases be achieved in spite of a peak nasal inspiratory flow reading as low as 50. Such patients are often unaware that they breath through the mouth for much of the time.
Reversibility of nasal obstruction can be assessed by measuring the PNIF after application of a nasal decongestant such as ephedrine by spray or drops. If the PNIF is not raised to a reading of over 100 by such treatment, then the obstruction may be associated with mucosal oedema, extensive polyps or anatomical abnormality. A trial of topical or systemic steroids may also bring the PNIF into the normal range (100 to 300 l/min).

2. Assessment of response to nasal provocation
Allergen or pharmacological mediator (eg histamine) application to the nasal mucosa in doses halving PNIF is usually associated with only minor and transient discomfort. Details of a simplified allergen provocation test using PNIF measurement have been published[1].

3. Home monitoring of PNIF
This may be useful in drug or immunotherapy trials in rhinitis, or for assessing the importance of environmental factors at home or work in individual patients with rhinitis. Cyclic changes in nasal airway patency can also be investigated, as can late responses to allergen provocation.

Normal Values PNIF
Repeated measurements on one occasion in trained subjects show a coefficient of variation of about 6%. Nasal airway patency varies with time and in many normal individuals the PNIF may vary in the course of a day by more than two-fold. Post decongestant readings are much more consistent, and consistency is also improved by avoiding factors associated with changes in the nasal airway, such as extremes of ambient temperature or humidity, spicy foods or irritant fumes etc.

Performance Accuracy
Accuracy ±10% or 10 l/min (whichever is greater) and repeatability of ± 5 l/min.

Cleaning your *In-check*
Immerse *In-check* in warm (but not hot) mild detergent solution for 2-3 minutes (maximum 5 minutes). Agitate the meter to ensure thorough cleaning.
Rinse in clean warm water and shake gently to remove any excess water. *It is important to rinse thoroughly to prevent salt spots appearing on the inside of the body and spindle.*
Allow to dry thoroughly before using again.
The expected life of In-check in normal use, is two years.

[1] M. J. Gleeson *et al Clin. Otolaryngol. 1986*, **11**, 99-107.

⚠ *Warning:*
With any inhalation device, it is important to check for loose foreign objects before the device is used. The transparent material used in the construction of the In-check enables the user to make a visual check before inhalation.
To prevent choking, please make sure there are no foreign objects in the device before use.

fr

Introduction
L'In-check est un instrument portatif de mesure du débit inspiratoire destiné à mesurer le débit inspiratoire par voie orale ou nasale. Il est conçu pour être utilisé par le patient en tant que moyen pratique de surveillance du débit inspiratoire, fournissant de ce fait une information précieuse quant au degré d'obstruction ou de restriction auquel les voies aériennes seraient soumises. On peut aussi l'utiliser dans l'évaluation de la technique utilisée pour les produits médicamenteux inhalés.
Lorsque l'on inspire à travers l'In-check, un curseur se déplace le long de l'échelle graduée pour indiquer la valeur du débit inspiratoire. Noter le débit obtenu en rapportant la position du curseur à l'échelle calibrée.

Maines d'application
Il est possible de se servir du In-check pour mesurer soit les débits inspiratoires maximaux, soit les débits sous-maximaux. Le boîtier transparent permet une vue qualitative de la manœuvre inspiratoire.
L'utilisation d'un masque facial est nécessaire lorsque l'on veut mesurer le débit inspiratoire nasal.
Dans les cas de mesure du débit inspiratoire oral, on devra utiliser pour chaque patient un embout buccal propre (de type standard ou filtre). L'In-check devra être nettoyé conformément aux directives décrites.
Pour remettre à zéro l'In-check, tenir l'instrument à la verticale, avec l'embout buccal tourne vers le hast, et tapoter avec la main le bout arrondi de l'instrument de mesure. Cela aura pour effet de dégager la masselotte de remise à zéro et qui remettra le curseur à la position de départ. Après avoir obtenu ce résultat, retournez à nouveau l'instrument de mesure afin de remettre la masselotte à sa position de repos.

Mode d'utilisation
Dans le but de minimiser les risques d'infection croisée, utiliser un filtre bactérien / viral de faible résistance.

a) Pour les débits inspiratoires oraux maximaux:
L'on devra demander au patient:
1. D'expirer à fond
2. De tenir l'In-check à l'horizontale avec les lèvres sérrées autour de l'embout buccal. Utiliser un pince-nez pour bloquer les narines
3. D'inspirer brusquement et avec énergie

Noter le débit inspiratoire et remettre l'In-check à zéro comme décrit ci-dessus.
Le débit inspiratoire maximal devrait être mesuré à trios reprises et l'on devra noter la valeur la plus élevée.

b) Pour les débit inspiratoires oraux sous-maximaux (entraînement à l'inhalateur):
Demander au patient:
1. D'expirer
2. De tenir l'In-check à l'horizontale avec les lèvres appliquées hermétiquement contre l'embout buccal
3. D'inspirer lentement et de manière contrôlée

En recommandant au patient d'inspirer plus ou moins énergiquement, l'on peut obtenir de débit représentatif.

c) Pour les débits inspiratoires nasaux maximaux:
Demander au patient:
1. D'expirer à fond
2. De tenir l'In-check à l'horizontale et de s'assurer que le masque facial se trouve appliqué hermétiquement contre le pourtour du nez
3. D'inspirer énergiquement par le nez

La manœuvre inspiratoire nasale maximale devra représenter une action courte et énergique d'une durée d'environ une seconde.
Le débit inspiratoire devra être noté et l'In-check remis à zéro comme indiqué ci-dessus.
Le test de mesure du débit inspiratoire nasal maximal devrait être répété trois fois et l'on devra noter la valeur la plus élevée dans le dossier du patient.
Note: *Enlever ses lunettes. Il est impératif de bien fermer la bouche.*
Prendre bien soins à ce que le masque soit appliqué hermétiquement contre la face. Différents masques sont disponibles dans des tailles variées afin d'épouser les différentes morphologies faciales.
Prendre soin de bien désinfecter le masque d'un patient à l'autre afin d'éviter les risques d'infection croisée.

Mesure du débit inspiratoire maximal
Le Débit Inspiratoire Maximal (DIM) représente une mesure spirométrique parmi un grand nombre d'autres. Le DIM est généralement mesuré grâce à des appareils spirométriques volumineux et, de ce fait, difficiles a utiliser a domicile.
L'instrument de mesure In-check a rendu cette perspective bien réelle et ouvre la porte à une meilleure compréhension du DIM.

Les applications de la mesure du débit inspiratoire oral
Les mesures des débits inspiratoires sous-maximaux sont de grande valeur lors de l'entrainement des patients quant à l'utilisation correcte des appareillages médicaux d'inhalation. Des études récentes ont mis en évidence les valeurs de débit inspiratoires necessaires à l'utilisation de differents modeles à inhalateurs.
L'utilisation de l'In-check permet d'adapter la technique a l'inhalateur utilise.

Les applications de la mesure du débit inspiratoirenasal maximal (DINM)
1. Diagnostic d'obstruction nasale
Chez certains patients la sensation d'obstruction nasale est tres subjective et exagerée. Dans d'autres cas, les mesures sont très basses chez des patients qui n'ont pas conscience de souffrir d'obstruction nasale parce qu'ils s'y sont habitués. Dans des cas semblables, il est possible d'obtenir une respiration tranquille par le nez en dépit d'une valeur mesurée du débit inspiratoire nasal maximal aussi basse que 50. Souvent, des patients de ce type ne se rendent pas compte qu'ils respirent par la bouche la plupart du temps.
On peut évaluer le degré de réversibilité d'une obstruction nasale en mesurant le DINM après la prise d'un décongestionnant nasal tel que l'éphédrine en pulvérisation ou en gouttes. Si le DINM n'est pas remonté à une valeur au dessus de 100 par un traitement de ce type, l'obstruction peut dans ce cas se trouver associée à un l'œdème de la muqueuse, à une polypose importante ou à une anomalie anatomique. Un essai de traitement local ou systémique aux stéroïdes pourrait aussi remonter la valeur du DINM au niveau de la fourchette normale (de 100 à 300 l/mn).

2. Évaluation de la réponse à la provocation nasale
L'application à la muqueuse nasale d'un allergène ou d'un médiateur pharmacologique (par ex. histamine), à des doses qui réduiraient de moitié le DINM, n'est généralement associée qu'à une gêne mineure ou transitoire. Des détails concernant un test simplifié de provocation à l'allergène utilisant la mesure du DINM ont fait l'objet d'une publication[1].

3. Monitorage à domicile du DINM
Ceci pourrait être utile dans les cas d'essais portant sur des médicaments ou de l'immunothérapie, ou pour évaluer l'importance de facteurs écologiques à domicile ou sur les lieux de travail chez des patients souffrant de rhinite. L'on peut aussi procéder à l'investigation de changements cycliques dans la perméabilité des voies aériennes nasales, de même qu'à celle des réponses retardées à la provocation par allergène.

Valeurs normales DINM
Des mesures répétée, lors de la même occasion, ont montré l'existence, chez des sujets entraînés, d'un coefficient de variation d'environ 6%. La perméabilité des voies aériennes nasales varie en fonction du temps et, chez de nombreux individus normaux, la valeur du DINM peut varier dans le courant d'une même journée d'un facteur de plus de deux. Des mesures après l'administration de décongestionnant sont beaucoup plus conséquentes, et le degré de conséquence se trouve lui-même amélioré lorsqu'on évite des facteurs associés à des modifications dans les voies aériennes nasales, tels que des valeurs extrêmes de la température ambiante et de l'humidité, de la nourriture épicée ou des vapeurs irritantes etc.

Précision de la performance
Précision de ± 10% ou 10 l/mn (au plus élevé des deux) et taux de reproduction de ± 5 l/mn.

Nettoyage de votre *In-check*
Trempez l'In-check dans une solution chaude (mais pas trop) d'un détergent doux pendant 2 à 3 minutes (maximum 5 minutes). Secouer l'appareil de mesure pour s'assurer d'un nettoyage à fond.
Rincer dans de l'eau modérément chaude et secouer avec douceur afin d'éliminer tout excès d'eau. *Il est important de rincer à fond afin d'éviter l'apparition de taches de sel à l'intérieur du boîtier et du fuseau.*
Laisser sécher à fond avant d'utiliser à nouveau.
La durée de vie du In-check dans des conditions d'utilisation normale est de deux ans.

[1] M. J. Gleeson *et al. Clin. Otolaryngol. 1968*, **11**. 99-107.

⚠ *Avertissement:*
Dans le cas de tout appareillage d'inhalation, il est important de vérifier la présence éventuelle de corps étrangers avant d'utiliser l'appareil. Le matériau transparent utilisé dans la fabrication du In-check permet à l'utilisateur de procéder à une vérification visuelle avant l'inhalation.
Pour éviter les risques d'étouffement, prenez soins de vérifier l'absence de corps étrangers dans l'appareil avant toute utilisation.

it

Introduzione
L'apparecchio in-check è un misuratore portatile del flusso inspiratorio orale o nasale. È uno strumento di facile utilizzo da parte del paziente che permette di controllare il flusso inspiratorio e fornisce preziose informazioni relativamenta al livello di ostruzione o restrizione delle vie respiratorie. Può inoltre essere usato nella valutazione della techica di assunzione di medicinali per inalazione.
Respirando nell'apparecchio in-check, il cursore si sposta lungo la scala indicando il flusso inspiratorio. Si registra quindi il valore ottenuto controllando la posizione del cursore rispetto alla scala calibrata.

Applicazione
L'apparecchio in-check può essere utilizzato per misurare i flussi d'inpirazione di picco e non di picco. Il suo corpo trasparente permette di osservare l'azione d'inspirazione.
Per la misurazione del flusso inspiratorio nasale è necessario applicare all'apparecchio una maschera da appoggiare sul viso.
Per il flusso inspiratorio orale si dovrà usare un boccaglio pulito (di tipo standard o con filtro) per ciascun paziente.
L'apparecchio in-check deve essere pulito seguendo le istruzioni riportate.
Per resettare l'apparecchio in-check tenerlo verticalmente con il boccaglio rivolto verso l'alto in modo da poter picchiettarele ggermente con la mano, dal basso, l'estremità arrotondata del misuratore. Ciè spesterà il poso magnetice di resettaggio, riportando il cursore nella posizione imiziale. A questo punto rovesciare il misuratore in modo che il peso magnetico ritorni nella posizione di attesa.

Istruzioni
Per minimizzare il rischio di infezioni crociate si puo utilizzare un filtro di batteri/virale a bassa resistenza.

a) Per flusso inspiratorio orale di picco
Chiedere al paziente di:
1. espirare a fondo
2. tenere l'apparecchio in-check orizzontalmente, con le labbra ben strette attorno al boccaglio. Per bloccare le narici usare una pinza stringinaso
3. inspirare in modo deciso e vigoroso

Prendere nota del flusso inspiratorio e resettare l'apparecchio in-check come descritto sopra.
Ammotare tre misurazioni del flusso inspiratorio di picco eregistrare il valore più alto.

b) Per flusso inspiratorio orale non di picco (addestramento all'uso dell'inalatore)
Chiedere al paziente di:
1. espirare
2. tenere l'apparecchio in-check orizzontalmente, con le labbra ben strette attorno al boccaglio
3. inspirare lentamente

Suggerendo al paziente di inalare in modo più o meno vigoroso è possibile ricavare una descrizione delle variazioni del flusso.

c) Per flusso inspiratorio nasale di picco
Chiedere al paziente di:
1. espirare a fondo
2. tenere l'apparecchio in-check orizzontalmente assicurandosi che la maschera sia ben stretta sul viso in modo che non vi sia passaggio di aria
3. inspirare in modo deciso con il naso

Per ottenere la misurazione del picco di flusso, l'azione di inspirazione dovrà essere breve e decisa, della durata di circa un secondo.
Prendere nota del flusso inspiratorio e resettare l'apparecchio In-check come descritto sopra.
Ripetere la prova del picco di flusso inspiratorio nasale tre volte e registrare il valore più alto nella cartella del paziente.
Nota: *Togliere gli occhiali. Tenere la bocca chiusa.*
Assicurarsi che la maschera sia ben stretta sul viso in modo che non vi sia passaggio d'aria. Sono disponibili maschere diverse e in una varietà di misure, adatte alle differenti forme del viso.
Per evitare il rischio di infezioni crociate disinfettare la maschera dopo l'uso con ciascun paziente.

Misurazione del picco di flusso inspiratorio
Il picco di flusso inspiratorio (Peak Inspiratory Flow - PIF) è una delle molte misurazioni spirometriche.
Generalmente viene misurato con grandi spirometri, pertanto non è stato oggetto di controlli su ampia scala dei pazienti a domicilio.
Con l'apparecchio in-check questi controlli diventano una realtà, rendendo possibile ottenere una maggiore conoscenza del picco di flusso inspiratorio.

Applicazioni della misurazione del flusso inspiratorio orale
Le misurazioni del flusso inspiratorio non di picco sono importanti quando si insegna ai pazienti l'uso corretto degli inalatori per uso terapeutico. Da studi recenti sono emerse indicazioni circa i flussi inspiratori ottimali per molti inalatori comunemente utilizzati nella terapia di malattie dell'apparato respiratorio.
Le informazioni relative alle misurazioni ottenute con l'apparecchio In-check consentono ai pazienti di regolare la propria techica di inalazione in modo da adattarla meglio all'inalatore utilizzato.

Applicazioni della misurazione del flusso inspiratorio nasale di picco (PNIF)
1. Diagnosi dell'ostruzione nasale
In alcuni pazienti che lamentano ostruzione nasale, la potenza respiratoria del naso è alquanto normale ed i sintomi sono dovuti alla consapevolezza della presenza di altre anormalità della cavità nasale, quale ad esempio turbinato prominente. Altre volte si ottengono letture sorprendentemente basse con pazienti che non si rendono conto dell'ostruzione nasale, e ciò perché vi ci sono abituati. In tali casi è possibile che essi abbiano uno respirazione silenziosa tramite il naso nonostante la lettura del flusso inspiratorio nasale di picco sia di appena 50. Spesso tali pazienti non si rendono conto di respirare per lo più attraverso la bocca.
È possibile valutare la reversibilità dell'ostruzione nasale misurando il PNIF dopo l'applicazione di un decongestionante nasale quale efedrina spray o in gocce. Se con tale trattamento il PNIF non sale ad un valore di 100 o superiore, l'ostruzione nasale potrà essere associata a edema della mucosa, polipi diffusi o anormalità anatomica. Anche una prova con steroidi topici o sistemici potrà portare il PNIF nella gamma normale (da 100 a 300 L/min).

2. Valutazione della reazione alla provocazione nasale
L'applicazione di un allergene o mediatore farmacologico (ad esempio istamina) alla mucosa del naso in dosi che dimezzano il PNIF crea in genere solamente disagio minimo e temporaneo. Sono stati pubblicati i dati di una prova semplificata di provocazione con allergene usando le misurazioni del PNIF[1].

3. Controllo in casa del PNIF
Questo può essere utile nelle prove di medicinali o immunoterapia nei casi di rinite, o per valutare l'importanza dei fattori ambientali nella casa o sul posto di lavoro per i singoli pazienti affetti da rinite. Si possono esaminare anche i cambiamenti ciclici nella potenza respiratoria del naso, come pure reazioni posticipate alla provocazione con allergene.

Valori normali PNIF
Le misurazioni ripetute su soggetti esperti nell'uso dell'apparecchio hanno mostrato in un'occasione un coefficiente di variazione di circa il 6%. La potenza respiratoria del naso varia con il tempo ed in molti individui normali il PNIF può variare nel corso della giornata di più del doppio. Le letture ricavate dopo l'assunzione di decongestionante sono molto più uniformi; l'uniformita migliora anche quando si evitano fattori associati ai cambiamenti nelle vie respiratorie quali estremi della temperatura ambiente o umidità, cibo piccante, esalazioni, ecc.

Precisione delle prestazioni
Precisione di ±10% o 10 L/mm (qualunque sia il valore maggiore) e ripetibilità di ±5 L/mm.

Pulizia dell'apparecchio in-check
Immergere l'apparecchio in-check in acqua calda (non bollente) con una soluzione detergente leggera per 2-3 minuti (massimo 5 minuti). Agitare il misuratore per garantire la pulizia completa.
Risciacquare in acqua calda pulita ed agitare delicatamente l'apparecchio per eliminare eventuale acqua depositata. *È importante risciacquare accuratamente onde evitare la formazione di macchie di sale all'interno del corpo e nell'alberino.*
Attendere che l'apparecchio sia completamente asciutto prima di riutilizzarlo.
La durata media dell'apparecchio in-check in normali condizioni diutilizzo è di due anni.

[1] M. J. Gleeson *et al. Clin. Otolaryngol. 1986*, **11**, 99-107.

⚠ *Avvertenza:*
Come con qualsiasi inalatore, prima di utilizzare l'apparecchio è importante controllare che al suo interno non vi siano corpi estranei. Il materiale trasparente con cui è costruito l'apparecchio in-check consente all'utente di effettuare un'ispezione visiva primadell'inalazione.
Per evitare la possibilità di soffocamento, prima dell'uso assicurarsi che al suo interno non vi siano oggetti estran.

de

Einleitung
Das In-check ist ein tragbares Gerät zum Messen des Einatmungsstroms, mit dem der eingeatmete Luftstrom durch den Mund oder durch die Nase bestimmt werden kann. Das Gerät ist für die Anwendung durch den Patienten vorgesehen und bietet eine einfache Methode zur Überwachung der Strömundsrate beim Einatmen. Es liefert wertvolle Informationen über das Ausmaß einer Obstruktion oder Einschränkung der Luftwege.
Es kann außerdem zur Beurteilung der Technik medikamentöser Inhalationsbehandlungen eingesetzt werden. Beim Einatmen durch das In-check-Gerät zeigt ein beweglicher Zeiger auf einer Skala die Stärke des eingeatmeten Luftstroms an. Die erreichte Strömungsrate läßt sich an der Position des Zeigers auf der Meßskala ablesen.

Anwendung
Das In-check-Gerät kann zur Messung des maximalen oder submaximalen Einatmungsstroms eingesetzt werden. Das durchsichtige Gehäuse gestattet eine qualitative Prüfung des Einatmungsvorgangs.
Zum Messen des Einatmungsstroms durch die Nase ist das Tragen einer Gesichtsmaske notwendig.
Zum Messen des Einatmungsstroms durch den Mund wird für jeden Patienten ein sauberes Mundstück benötigt (Standardausführung oder Filterausführung). Das In-check-Gerät muß entsprechend der Anleitung gereinigt werden.
Um das In-check-Gerät wieder in seine Grundstellung zurückzuversetzen, wird das Instrument senkrecht gehalten, so daß sich das Mundstück zuoberst befindet und man mit der Hand von unten vorsichtig gegen das abgerundete Ende des Meßgeräts klopfen kann. Dadurch wird das magnetische Rückstellgewicht gelöst und der Zeiger kehrt wieder in seine Ausgangsposition zurück. Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, wird das Instrument auf den Kopf gedreht, damit das Magnetventil wieder in seine Ruhestellung zurückkehren kann.

Gebrauchsanleitung
Zur Einschränkung des Risikos für Kreuzinfektionen kann ein Bakterien-/Virenfilter mit einem geringen Widerstand verwendet werden.

a) Messon des maximalen Einatmungsstroms durch den Mund
Der Patient wird aufgefordert,
1. ganz auszuatmen
2. das In-check-Gerät waagrecht zu halten und die Lippen fest um das Mundstück zu schließen. Die Nasenlöcher können dabei durch eine Nasenklemme verschlossen werden
3. schnell und kräftig einzuatmen

Der Wert für den Einatmungsstrom wird notiert und das In-check-Gerät wird in der oben beschriebenen Weise wieder in seine Grundstellung zurückversetzt.
Es müssen drei Messungen des maximalen Einatmungsstroms vorgenommen werden, von denen das höchste Ergebnis dokumentiert wird.

b) Messen des submaximalen Einatmungsstroms durch den Mund (Inhalatortraining)
Der Patient wird aufgefordert,
1. auszuatmen
2. das In-check-Gerät waagrecht zu halten und die Lippen fest um das Mundstück zu schließen
3. langsam und kontrolliert einzuatmen

Indem man den Patienten bittet, mehr oder weniger kräftig einzuatmen, kann eine beschriebene Einatmungsrate erreicht werden.

c) Messen des maximalen Einatmungsstroms durch die Nase
Der Patient wird aufgefordert,
1. ganz auszuatmen
2. das In-check-Gerät waagrecht zu halten und dafür zu sorgen, daß die Gesichtsmaske luftdicht um die Nase abschließt.
3. kräftig durch die Nase einzuatmen.

Beim Einatmen durch die Nase zum Messen des maximalen Einatmungsstroms muß der Patient etwa eine Sekunde lang kurz und kräftig einatmen.
Der Einatmungsstrom wird dokumentiert und das In-check-Gerät wird in der weiter oben beschriebenen Weise in seine Grundstellung zurückversetzt.
Es müssen drei Messungen des maximalen Einatmungsstroms durch die Nase vorgenommen werden, von denen das höchste Ergebnis im Krankenblatt des Patienten vermerkt wird.
Hinweis: *Brillenträger sollten die Brille abnehmen. Der Mund muß geschlossen bleiben.*
Es muß sorgfältig darauf geachtet werden, daß die Maske luftdicht am Gesicht abschließt. Es gibt verschiedene Masken in unterschiedlichen Größen, um den verschiedenen Gesichtsformen gerecht zu werden.
Die Maske muß desinfiziert werden, bevor sie von einem anderen Patienten getragen wird, um das Risiko für Kreuzinfektionen zu vermeiden.

Messung des maximalen Einatmungsstroms
Die Messung des maximalen Einatmungsstroms ist eine von zahlreichen spirometrischen Messungen. Der maximale Einatmungsstrom wird im allgemeinen mit Hilfe großer Spirometer gemessen und diese Methode ist deshalb bisher nicht in großem Umfang im Rahmen einer seriellen Überwachung der Heimtherapie eingesetzt worden.
Mit dem In-check-Gerät rückt diese Anwendung jetzt in greifbare Nähe und es eröffnet einen Zugang zu einem besseren Verständnis des maximalen Einatmungsstroms.

Anwendungsgebiete für die Messung des ordlen Einatmungsstroms
Messungen des submaximalen Einatmungsstroms sind dann wertvoll, wenn Patienten zur richtigen Anwendung von medizinischen Inhalationsgeräten erzogen werden sollen. Neuere Studien haben für viele der gebräuchlichsten Inhalationsgeräte für die Verabreichung von Medikamenten bei Atemwegserkrankungen Hinweise auf Zielwerte für den Einatmungsstrom geliefert.
Anhand der Messungen, die der Patient mit dem In-check-Gerät vornehmen kann, hat er die Möglichkeit, die Inhalationstechnik so zu verändern, daß sie für sein Inhalationsgerät optimal eingestellt ist.

Anwendungsgebiete für die Messung des maximalen Einatmungsstroms durch die Nase
1. Zur Diagnose von Nasenwegsverschlüssen
Bei manchen Patienten, die über einen Nasenwegsverschluß klagen, liegt eine völlig normale Durchgängigkeit der Nasenwege vor, und das Symptom ist auf eine andere Anomalie der Nasenhöhle zurückzuführen, die dem Patienten bewußt ist, wie z.B. eine hervortretende Nasenmuschel. In anderen Fällen wurden erstaunlich niedrige Meßwerte gewonnen, obwohl den Patienten der Nasenwegsverschluß nicht bewußt war, weil sie sich schon längst daran gewöhnt hatten. In solchen Fällen kann trotzdem ein ruhiges Einatmen durch die Nase erreicht werden, auch wenn die Messungen des maximalen Einatmungsstroms durch die Nase nur einen Wert von 50 erreichen.
Diesen Patienten ist häufig nicht bewußt, daß sie die meiste Zeit durch den Mund atmen.
Die Umkehrbarkeit des Nasenwegsverschlusses kann mit Hilfe von Messungen des maximalen Einatmungsstroms durch die Nase nach Applikation eines Dekongestionsmittels, wie z.B. Ephedrin als Spray oder als Tropfen, beurteilt werden. Erreicht der Wert für den maximalen Einatmungsstrom durch die Nase nach einer solchen Behandlung nicht einen Wert von über 100, kann der Verschluß auf ein Schleimhautödem, ausgedehntes Polypenwachstum oder anatomische Mißbildungen zurückzuführen sein. Auch ein Behandlungsversuch mit topischen oder systemischen Steroiden kann den maximalen Einatmungsstrom durch die Nase in den Normalbereich befördern (100 bis 300 l/min).

2. Beurteilung der Reaktion auf einen nasalen Provokationstest
Die Applikation von Allergenen oder pharmakologischen Mediatoren (z.B. Histamin) auf die Nasenschleimhaut in Dosen, die zu einer Halbierung des maximalen Einatmungsstroms durch die Nase führen, ist in der Regel nur mit geringen und vorübergehenden Beschwerden verbunden. Die Ergebnisse eines vereinfachten Allergenprovokationstests mit Messung des maximalen Einatmungsstroms durch die Nase wurden veröffentlicht[1].

3. Überwachung des maximalen Einatmungsstroms zu Hause
Diese Möglichkeit kann zur Überwachung von Arzneimitteln oder immuntherapeutischen Versuchen bei Rhinitis oder zur Beurteilung der Bedeutung von Umweltfaktoren zu Hause oder am Arbeitsplatz bei manchen Patienten mit Rhinitis von Bedeutung sein. Auch zyklische Veränderungen der Durchgängigkeit der Nasenwege können auf diese Weise untersucht werden, wie auch Spätreaktionen auf einen Allergenprovokationstest.

Normalwerte
Maximaler Einatmungsstrom durch die Nase Wiederholte Messungen, die bei einer Gelegenheit bei entsprechend erzogenen Patienten durchgeführt wurden, zeigen einen Variationskoeffizienten von ungefähr 6%. Die Durchgängigkeit der Nasenwege verändert sich mit der Zeit und bei vielen gesunden Personen unterliegt der maximale Einatmungsstrom durch die Nase im Verlauf eines Tages Schwankungen mit Abweichungen der Werte um mehr als dasDoppelte. Die Messungen nach Anwendung eines Dekongestionsmittels sind wesentlich einheitlicher und die Einheitlichkeit läßt sich durch Vermeidung von Faktoren, die mit Veränderungen der Nasenwege verbunden sind, wie z.B. Temperaturextreme oder Feuchtigkeit, scharf gewürzte Speisen oder reizende Dämpfe usw., zusätzlich verbessern.

Genauigkeit der Leistung
Die Genauigkeit beträgt ± 10% oder 10 l/min (je nachdem, welcher Wert größer ist) und die Wiederholbarkeit ± 5 l/min.

Reinigung des *In-check*-Geräts
Das In-check-Gerät in warmes (aber nicht heißes) Wasser mit einem milden Reinigungsmittel tauchen und 2-3 Minuten (maximal 5 Minuten) darin liegen lassen. Das Gerät schütteln, damit es gründlich gereinigt wird.
Gerät mit sauberem, warmem Wasser abspülen und überschüssiges Wasser vorsichtig abschütteln. *Es ist wichtig, das Gerät sehr gründlich zu spülen, damit sich innen im Gehäuse und an der Spindel keine Salzflecken bilden können.*
Gerät vor dem Gebrauch gründlich trocknen.
Die erwartete Nutzungsdauer des In-check-Geräts liegt bei normalem Gebrauch bei zwei Jahren.

[1] M. J. Glesson *et al. Clin. Otolaryngol. 1986*, **11**, 99-107.

⚠ *Warnhinweis:*
Wie jedes Inhalationsgerät muß auch das In-check-Gerät vor dem Gebrauch überprüft werden, damit es keine losen Fremdkörper enthält. Das transparente Material, das zur Herstellung des Geräts verwendet wurde, macht es dem Benutzer leicht, das Gerat vor der Anwendung einer Sichtprüfung zu unterziehen.
Zur Abwendung einer Erstickungsgefahr muß sich der Anwender vor Gebrauch unbedingt vergewissern, daß sich in dem Gerät keine Fremdkörper befinden.

nl

Introductie
De In-Check is een draagbare respiratiestroommeter voor het meten van orale of nasale respiratie. Het toestel is bedoeld voor gebruik door de patiënt om respiratiest-roomsnelheden op een eenvoudige wijze te controleren, en waardevolle informatie te geven over de graad van obstructie of beperking in de luchtwegen. Het toestel kan ook worden gebruikt in de techniekbeoordeling voor respiratiemedicatie.
Inademing door de In-Check zal een cursor over een schaal doen bewegen en de respiratiestroom aangeven. De bereikte stromingsnelheid kan door de positie van de cursor op de gekalibreerde schaal worden gecontroleerd.

Toepassing
De In-Check kan worden gebruikt om piek- of submaxi-male respiratiestromingen te meten. Het transparante lichaam laat een kwalitatief overzicht van het respiratie-manoeuvere toe.
Voor het meten van nasale respiratiestromingen is aanhechting van een gezichtsmasker noodzakelijk.
Voor orale respiratiestromingen moet voor elke patiënt een schoon mondstuk (standaard of filtertype) worden gebruikt. De In-Check moet worden gereinigd, zoals beschreven in de instructies.
Om de In-Check terug te stellen dient u het instrument verticaal te houden met het mondstuk volledig bovenaan. Tik voorzichtig op het afgeronde einde van de meter. Het magnetische terugstelgewicht zal worden bevrijd en zal de cursor opnieuw in de startpositie plaatsen. Keer dan de meter om. Het magnetisch gewicht zal terug in de ruststand worden geplaatst.

Instructies
Een bacteriaal/viraal filter met lage weerstand kan worden gebruik tom het risico van kruisinfectie te minimaliseren.

a) Voor orale piek respiratiestromingen:
De patiënt moet worden gevraagd om:
1. Volledig uit te ademen
2. De In-Check horizontaal met de lippen rond het mondstuk te houden
3. Snel en krachtig in te ademen

De respiratiestroming moet worden afgelezen en de In-Check zoals eerder beschreven worden teruggesteld.
De piek respiratiestroming moet driemaal worden gemeten, en het hoogste resultaat moet worden genoteerd.

b) Voor orale submaximale respiratiestromingen (inhaleertoesteltraining)
De patiënt moet worden gevraagd om:
1. Volledig uit te ademen
2. De In-Check horizontaal met de lippen rond het mondstuk te houden
3. Oo een langzame, regelmatige wijze in te ademen

Door de patient te adviseren om minder krachtig of krach-tiger in te ademen kan een beschreven stromingssnelheid worden bereikt.

c) Voor piek nasale respiratiestromingen:
De patiënt moet worden gevraagd om:
1. Volledig uit te ademen
2. De In-Check horizontaal te houden en te controleren dat het gezichtsmasker luchtdicht rond de neus is geplaatst
3. Krachtig door de neus in te ademen

Het piek nasaal respiratieманoeuvere dient een korte scherpe inhalingsactie te zijn met een duurtijd van ongeveer een seconde.
De respiratiestroming moet worden afgelezen en de In-Check zoals eerder vermeld worden teruggesteld.
De piek respiratiestroming moet driemaal worden gemeten, en het hoogste resultaat moet worden genoteerd.
Opmerking: *Brillen moeten worden afgenomen. De mond moet gesloten zijn.*
Draag er zorg voor dat het masker luchtdicht op het gezicht is geplaatst. Er zijn verschillende maskers voor verschillendege zichtsvormen beschikbaar met een varieteit aan afmetingen.
Het masker moet na gebruik worden gedesinfecteerd om het risico van kruisinfectie te voorkomen.

Piek respiratiestroming meting
Piek respiratiestroming meting (PIF) is één van een aantal spirometrische metingen. PIF wordt gewoonlijk gemeten met gebruik van grotere machines, en werd daarom nooit gebruikt voor uitgebreide aflezingen thuis.
De In-Check meter maakt dit prospect een realiteit en opent de deur naar een beter begrip van PIF.

Toepassingen van orale respiratiestroming meting
Metingen van submaximale respiratiestromingen zijn waardevol bij het trainen van patiënten in het correct gebruik van de medische inhaleringstoestellen. Recente studies hebben doelrespiratiemetingen aangetoond voor vele van de toestellen voor het inhaleren van medicatie die algemeen worden gebruikt voor het toedienen van medicamenten voor ademhalingsziektes.
Feedback van de In-Check meter laat de patiënt toe hun ademhalingstechniek aan te passen aan hun eigen inhaleertoestel.

Toepassingen van piek nasale respiratiestroming meting (PNIF

PORTABLE INSPIRATORY FLOW METER

CLEMENT CLARKE INTERNATIONAL
Tradition and Innovation

Clement Clarke International Ltd.
Edinburgh Way Harlow
Essex CM20 2TT UK
Tele No: +44 (0)1279 414969
Fax No: +44 (0)1279 635232

Part no. 1902164
Issue no. 6 02/15

Flæðispróf hámarksinnöndunar um nef ætti að endurtaka þrisvar og skrá þar hæstu niðurstöðu una í sjúkraskrá sjúklingsins.
Ath.: *Gleraugu ætti að fjarlægja. Munnurinn verður að vera lokaður.*
Gæta þer þess að tryggja að gríman falli loftþétt að andlitinu. Mismunandi grímur og ymsar stærðir fást svo henta megi andlitsfalli.
Sótthreinsa ætti grímuna milli sjúklinga til að koma í veg fyrir smithættu.

Mæling hámarksflæð is innöndunar.

Hámarksflæði innöndunar (skammstafað PIF) er ein fjölmargra öndunarmælinga. PIF er venjulega mælt í stórum öndunarmælingavélum og hefur þess vegna ekki verið notuð mikið við rað mælingar í heimahúsum. In-check mælirinn gerir þetta mögulegt og opnar gáttir að auknum skilningi á öndunarmælingum (PIF).

Notkun flæðimælinga öndunar um munn.

Mælingar næstmesta flæðis innöndunar eru mikilsverðar þegar þjálfa þarf sjúklinga í réttri notkun innöndunartækja. Nylegar athuganir hafa bent til innöndunarflæðis vegna margra lyfja, sem eru almennt notuð til að lækna öndunarfærasjúkdóma.
Aftur virkni sjúklingsins af In-check mælingum gerir honum kleift að stilla innöndunartækni sína eins og best hentar.

Notkun hámarksflæðimælinga innöndunar um nef (PNIF).

1. **Sjúkdómsgreining stíflu í nefi.**
   Hjá sumum sjúklingum, sem kvarta undan nefstíflu, er loftgangur í nefi aleg eðlilegur og sjúkdómseinkennin stafa af því að vitað er um eitthvað annað óeðlilegt í nefholi eins og áberandi nefaða. Í öðrum tilfellum mælast merkilega lág gildi hjá sumum sjúklingum, sem ekki vita af nefstíflu af því að þeir eru orðnir henni vanir. Í þeim tilfellum er hægt að ná rólegri öndun um nefið þ þrátt fyrir að hámarksmæling innöndunarflæðis um nefið mælist ekki nema 50. Slíkir sjúklingar vita oft ekki að þeir anda mikið til með munninum.
   Hægt er að meta afturkvæmni nefstíflu með því að mæla PNIF eftir notkun blóðsóknarlyfs eins og ephedrine í úða- eða dropaformi. Ef PNIF hækkar ekki yfir 100 með slíkri meðferð má tengja stífluna slímbúga, miklum beræxlum eða óeðlilegum líffærum. Einnig getur tilraun með staðlega kerfisstera komið PNIF á eðlilegt stig (100 til 300 l/mín.).
2. **Mat á svörun við nefertingu.**
   Ofnæmisvaki eða lyfjamillilíður (t.d. histamine) borinn á slímhúð nefs blandaður PNIF að hálfu er venjulega talinn valda minni háttar og skammvinnum ópægindum. Gefnar hafa verið út upplysingar um prófun á ofnæmisvaka og ertingu með því að nota PNIF mælingu[1].
3. **Heimamæling PNIF.**
   Hún getur komið að góðum notum við prófun lyfja eða ónæmismeðferð nefslímubólgu eða til að meta umhverfisáhrif á heimilum og vinnustöðum sjúklinga með nefslímbólgu. Einnig er hægt að rannsaka lotubreytingar í nefi og seinkun svarana við ofnæmisertingu.

Eðlileg gildi PNIF.

Endurteknar mælingar syndu einu sinni u.þ.b. 6% stuð ulbreytingu. Ástand í nefi er breytilegt á ymsum tímum og hjá mörgum venjulegum einstaklingum kann PNIF að breytast meira en tvöfalt áeinum degi. Aflestrar eftir blóðsóknarthefandi meðferð eru í mum meira samræmi, sem einnig eykst ef komist er hjá atriðum í sambandi við breytingar í öndunarvegi nefs, svo sem miklum breytingum hita og raka, krydduðum matvælum eða ertandi lykt o.s.frv.

Nákvæmni.

± 10% nákvæmni eða 10 l/mín. (hvort sem meira er) og endurtekningar ± 5 l/mín.

In-check þrif.

Bleytið In-check upp í volgri (en ekki heitri) og mildri hreinsiupplausn í 2 - 3 mínútur (hámark 5 mínútur). Hreyfið mælinn til að tryggja að hann hreinsist vel. Skolið í hreinu, volgu vatni og hristið varlega til að fjarlægja vatn. *Áríðandi er að skola vel til að koma í veg fyrir að saltblettir setjist á innanverðan mælinn og teininn. Látið tækið þorna vel áður en það er notað aftur.*
Með eðlilegri notkun er væntanleg ending In-check tvö ár.
[1]M. J. Gleeson *et al Clin. Orolaryngol 1985*, **11**, 99-107.

⚠ ***Aðvörun.***
Þegar innöndunartæki eru notuð er mikilsvert að athuga að engin óhreinindi séu fyrir hendi. Þetta sést vel með því In-check er úr gegnsæu efni.
Góðfúslega tryggið að engin óhreinindi séu í tækinu svo komið sé í veg fyrir köfnun.

da

Indledning

In-check er et bærbart inspirationsflowmeter, som måler enten oralt eller nasalt inspirationsflow. Det er beregnet til patientbrug, som en enkel måde at overvåge inspirationsflowhastigheder på, og giver værdifuld information om obstruktions- eller begrænsningsgraden indeni luftvejene. Det kan også bruges ved teknikvurdering i forbindelse med inhalationsmedikamenter.
Når der åndes ind gennem In-check bevæger en markør sig langs skalaen og viser dermed inspirationsflowet. Den opnåede flowhastighed kan noteres ved at kontrollere markørens position mod den kalibrerede skala.

Applikation

In-check kan bruges til at måle enten peak eller submaksimale inspirationsflow. Den gennemsigtige yderdel gør det muligt at inspicere inspirationsmanøvren kvalitativt.
For måling af nasale inspirationsflow er det nødvendigt at bruge en ansigtsmaske.
For orale inspirationsflow skal et rent mundstykke (standard- eller filtertype) bruges for hver patient.
In-check skal rengøres i henhold til vejledning.
In-check nulstilles ved at holde instrumentet lodret med mundstykket foroven, så man nedefra kan banke let på den afrundede ende af flowmeteret med hånden. Den magnetiske nulstillingsvægt vil løsne sig og derefter returnere markøren til en startposition. Når dette er sket, vendes der op og ned på flowmeteret, for at returnere den magnetiske vægt til dens hvileposition.

Vejledning

Et lav-modstands bakterie/virusfilter kan bruges til at minimere risiko for krydsinfektion.

a) For orale peak-inspirationsflow:
Bed patienten om at:
1. Ånde helt ud
2. Holde In-check vandret, med læberne forseglet rundt om mundstykket. En næseklemme kan bruges til at lukke næseborene
3. Ånde hurtigt og kraftigt ind

Inspirationsflowet skal nedskrives og In-check nulstilles som beskrevet ovenfor.
Peak-inspirationsflowet skal måles tre gange og det højeste resultat skal noteres.

b) For orale submaksimale inspirationsflow (inhalatortræning):
Bed patienten om at:
1. Ånde ud
2. Holde In-check vandret, med læberne forseglet rundt om mundstykket
3. Ånde ind på en langsom og kontrolleret måde

En beskrevet flowhastighed kan opnås ved at rådgive patienten om at inhalere mere eller mindre kraftigt.

c) For peak-nasale inspirationsflow:
For måling af nasale inspirationsflow er det nødvendigt at bruge en ansigtsmaske.
Bed patienten om at:
1. Ånde ud
2. Holde In-check vandret, og sikre at ansigtsmasken danner en lufttæt forsegling rundt om næsen
3. Ånde kraftigt ind gennem næsen

Den peak-nasale inspirationsmanøvre skal være en kort, hurtig inspirationsaktion af cirka et sekunds varighed. Inspirationsflowet skal nedskrives og In-check nulstilles, som beskrevet ovenfor.
Den peak-nasale inspirationsflow-test skal gentages tre gange og det højeste resultat skal noteres i patientens journal.

Bemærk: *Briller skal fjernes Munden skal være lukket*

Vær omhyggelig med at sørge for, at masken danner en luftæt forsegling rundt om ansigtet. Forskellige masker kan være tilgængelige i et udvalg af størrelser for at passe til forskellige ansigtsformer.
Masken skal disinficeres efter patientbrug for at undgå risiko for krydsinfektion.

Måling af peak-inspirationsflow

Peak-inspirationsflow (PIF) er en af talrige spirometriske målinger. PIF måles normalt på store spirometrimaskiner og har derfor ikke været underkastet omfattende seriel-hjemmemonitorering.
In-check flowmeteret gør denne mulighed til en realitet og åbner dermed op for en større forståelse af PIF.

Applikationer af oral-inspirationsflowmålinger

Målinger af submaksimale inspirationsflow er værdifulde, når patienter undervises i den korrekte brug af inhalatorindretninger. Nylige undersøgelser har angivet mål-inspirationsflow for mange af de inhalatorindretninger, der sædvanligvist bruges til at indgive medicin for respirationssygdomme.
Den feedback, som fås fra In-check måling, gør det muligt for patienter at justere deres inhalationsteknik, så den passer bedst til netop deres inhalator.

Applikationer af peak-nasale inspirationsflowmålinger (PNIF)

1. **Diagnose på nasal obstruktion**
   Hos visse patienter, som klager over nasal obstruktion, er nasal luftvejsåbenhed ret normal, og symptomerne skyldes tilstedeværelsen af en anden abnormitet såsom en fremspringende concha nasalis. I andre tilfælde opnås overraskende lave aflæsninger hos patienter, som er uvidende om nasal obstruktion, fordi de har vænnet sig til det. På trods af peak-nasale inspirationsflow så lave som 50, kan der i sådanne tilfælde opnås en stille indånding gennem næsen. Sådanne patienter er ofte ikke klar over, at de trækker vejret gennem munden det meste af tiden.
   Reversabilitet af nasal obstruktion kan vurderes ved at måle PNIF efter anvendelse af kongestionsmiddel, såsom efedrin, enten i spray- el ler dråbeform. Hvis PNIF ikke stiger til en værdi på over 100 ved sådan behandling, kan obstruktionen være forbundet med mucosalødemer, omfattende polypper eller anatomisk abnormitet. En undersøgelse af topiske eller systemiske steroider kan også bringe PNIF indenfor det normale område (100 til 300 L/min).
2. **Responsvurdering overfor nasal provokation**
   Applikation af allergen- eller farmakologisk accelerator (f.eks. histamin) på nasal mucosa i dosis, der halverer PNIF, er normalt kun forbundet med mindre og forbigående ubehag. Detaljer fra en forenklet allergen-provokationstest, hvori der blev brugt PNIF-målinger, er blevet offentliggjort[1].
3. **Hjemmemonitorering af PNIF**
   Dette kan være nyttigt i lægemiddel- eller immunterapi-undersøgelser for næsekatar, eller for at vurdere vigtigheden af miljømæssige faktorer i hjemmet eller på arbejdet for individuelle patienter, der lider af næsekatar. Cykliske ændringer i nasal luftvejsåbenhed kan også undersøges, ligesom sene responser overfor allergenprovokation.

Normale værdier PNIF

Gentagne målinger ved samme lejlighed hos oplærte personer gav en variationskoefficient på omkring 6%. Nasal luftvejsåbenhed varierer med tid og hos mange normale personer kan PNIF variere over dobbelt så meget i løbet af en dag. Post-kongestionsmiddel aflæsninger er langt mere ensartede og ensartetheden forbedres ligeledes ved at undgå faktorer, der er knyttet til ændringer i næsehulen, såsom yderligheder med hensyn til omgivende temperatur eller fugtighed, krydret mad eller irriterende gasarter etc.

Præstationsnøjagtighed

Nøjagtigheden er ± 10% eller 10 l/min (hvad end er størst) og med en repetérbarhed på ± 5 l/min.

Sådan rengøres In-check

Læg In-check ned i en varm (men ikke skoldhed), mild sæbevandsopløsning i 2-3 minutter (maksimalt 5 minutter). Bevæg flowmeteret frem og tilbage for at sikre grundig rengøring.
Skyl det i rent, varmt vand og ryst forsigtigt for at fjerne overskydende vand. *Det er vigtigt at rense grundigt for at forhindre, at der dannes kalkpletter på inderside af yderdel og spindel.*
Flowmeteret skal tørre helt, før det bruges igen.
Under normal brug har In-check en forventet levetid på to år.

[1]M.J. Gleeson *et al. Clin. Otolaryngol. 1986*, **11** 99-107.

⚠ Advarsel:

For at forhindre kvælning skal det sikres, at der ikke findes nogen fremmede dele i indretningen før brug.
Som med enhver inhalationsindretning er det vigtigt at kontrollere at der ikke findes nogen fremmede dele inden in-check bruges. Det gennemsigtige materiale, som er brugt i fremstillingen af In-check, betyder at brugeren visuelt kan undersøge den før brug.

sv

Inledning

In-check är en bärbar inandningsmätare som mäter inandningsflödet i antingen munnen eller näsan. Med den kan patienten själv enkelt mäta inandningsflödet och få värdefull information om i vilken omfattning luftvägarna är blockerade eller begränsade. Den kan även användas för utvärdering av olika metoder att inhalera medicin.
När man andas genom In-check ger en visare utslag på en skala som anger inandningsflödet. Flödeshastigheten fås genom att jämföra skalutslaget med en kalibrerad skala.

Användning

In-check kan användas för att mäta antingen för höga eller för låga inandningsflöden. Tack vare den genomskinliga cylindern får man en kvalitativ överblick av inandningsförloppet.
Vid mätning av inandningsflödet genom näsan används även ansiktsmask.
Vid mätning av inandningsflödet genom munnen används ett rent munstycke (av standard eller filtertyp) för varje enskild patient. Rengöring av In-check sker enligt instruktionerna.
För att nollställa In-check håller man instrumentet vertikalt med munstycket uppåt samtidigt som man slår lätt med den andra handen mot mätarens rundade nederdel. Det utlöser den magnetiska återställningsvikten som får visaren att återgå till utgångsläget. När visaren är återställd vänds mätaren helt åt andra hållet så att magnetvikten återgår till låst läge.

Instruktioner

Ett lågresistent bakterie/virusfilter kan användas för att minska eventuell infektionsrisk.

a) För högsta inandningsflöde genom munnen:
Patienten bör:
1. Andas ut helt
2. Hålla In-check horisontalt med läpparna slutna om munstycket. Näsklämma kan även användas för att blockera näsan
3. Andas in snabbt och kraftigt

Inandningsflödet avläses varefter In-check nollställs enligt ovan.
Högsta inandningsflöde bör avläsas tre gånger varav högsta värdet noteras.

b) För sub-maximalt inandningsflöde genom munnen (inhalatorträning):
Patienten bör:
1. Andas ut
2. Hålla munstycket In-check horisontalt med läpparna slutna om
3. Andas in långsamt och kontrollerat

Genom att instruera patienten att andas mer eller mindre kraftfullt kan man uppnå önskad flödeshastighet.

c) För högsta inandningsflöde genom näsan:
Patienten bör:
1. Andas ut helt
2. Hålla In-check horisontalt och se till att ansiktsmasken sluter tätt runt näsan
3. Andas in kraftigt genom näsan

Det maximala inandningsförloppet genom näsan bör bestå av en kort, kraftig inandning som varar cirka en sekund.
Inandningsflödet avläses varefter In-check nollställs enligt ovan.
Högsta inandningsflöde genom näsan bör avläsas tre gånger varav högsta värdet noteras.
OBS: *Eventuella glasögon måste avlägsnas. Munnen måste hållas stängd.*
Man måste vara noga med att ansiktsmasken sluter tätt mot ansiktet. Man kan använda flera ansiktsmasker av olika storlek för att anpassa den efter patientens ansiktsform.
Masken bör desinficeras mellan varje patient för att undvika eventuell infektionsrisk.

Mätning av högsta inandningsflöde

Högsta inandningsflöde (PIF Peak Flow) är ett av flera spirometervärden. PIF mäts vanligtvis i en stor spirometer och har därför tidigare inte kunnat utföras i större omfattning i hemmiljön.
Med In-check mätaren möjliggörs hemmätningar vilket medför en kraftigt ökad förståelse av PIF.

Tillämpning av oral andningsflödesmätning

Uppmätningen av sub-maximala inandningsflöden har stor betydelse när man tränar patienten att använda inhalator. I nyligen utförda studier har man fått fram ideala inandningsflöden för många medicininhalatorer som vanligtvis används vid medicinering av luftvägssjukdomar. Den feedback som patienten får från In-check mätningarna gör det möjligt att korrigera inhaleringstekniken för att uppnå bästa möjliga resultat.

Tillämpning av maximal nasal inandningsflödesmätning (PNIF)

1. **Diagnosticering av nästäppa**
   Vissa patienter som klagar över nästäppa har helt normal luftvägskapacitet. Symptomen kan hänga samman med en medvetenhet om andra abnormaliteter i näshålan som till exempel utstående näsben. I andra fall kan förvånansvärt låga mätvärden utläsas hos patienter som inte upplever någon nästäppa efter som de är vana vid sin situation. Stilla andning genom näsan kan i dessa fall uppnås trots ett högsta näsinandningsflöde av endast 50. Dessa patienter är ofta omedvetna om att de till största delen andas genom munnen.
   Hävning av nästäppa kan utvärderas med hjälp av PNIF-mätning efter medicinering med näsupplösande medel som till exempel efedrin i form av spray eller näsdroppar. Om PNIF- värdet inte höjs till ett värde över 100 efter behandlingen kan nästäppan bero på slemhinneutsöndring, för stora polyper eller någon form av anato misk abnormalitet. Försök med lokalverkande eller kroppsverkande steroider kan även få PNIF att anta normalvärden (mellan 100 till 300 L/min).
2. **Utvärdering av näsretningsreaktion**
   Att applicera en allergen eller farmakologisk agent (t.ex. histamin) på näsans slemhinnor i doser som halverar PNIF ger vanligtvis endast med mindre och övergående obehag. En detaljerad rapport av en förenklad allergenretningstest med PNIF-mätning finns publicerad.
3. **Egen PNIF-mätning**
   Detta kan visa sig användbart vid medicinerings- eller immunterapit est eller för att utvärdera inverkan av miljöfaktorer i hemmiljön eller på arbetsplatsen för enskilda rinit patienter. Cykliska förändringar i näsans luftvägskapacitet kan även undersökas såväl som fördröjda reaktioner på allergenretning.

Måling af PNIF (Peak Nasal Inspiratory Flow)

1. **Diagnose av nasal obstruksjon.**
   Hos noen pasienter som klager over tett nese, er luftpassasjen i nesen nærmest normal. Symptomene skyldes bevissthet om andre forhold i nesekaviteten, for eksempel en forstørret nesemusling. I andre tilfeller kan man finne overraskende lave resultater hos pasienter som ikke er oppmerksomme på at de har nasal obstruks jon, fordi de er blitt vant til det. I slike tilfeller kan rolig pusting gjen nom nesen oppnås selv når PNIF er så lav som 50. Slike pasienter er ofte ikke klar over at de puster gjennom munnen store deler av tiden.
   Tilbakegang av nasal obstruksjon kan konstateres ved å måle PNIF etter bruk av et nasalt avsvellingsmiddel, for eksempel efedrin i spray- eller dråpeform. Hvis PNIF-verdien ikke øker til over 100 ved slik behandling, kan obstruksjonen tilskrives slimhinneødem, uttalte polypper eller anatomiske forhold. Lokal eller systematisk kortisonbehandling kan også få PNIF til å ligge innenfor normalområdet (100 til 300 l/min).
2. **Vurdering av respons på nasal provokasjon**
   Bruk av allergene eller farmakologiske substanser (for eksempel histamin) på neseslimhinnen i doser som halverer PNIF, er vanligvis forbundet med kun mindre plager eller ubehag. Det er publisert en beskrivelse av en enkel allergenprovokasjonstest med bruk av PNIFmålinger[1].
3. **Hjemmemåling av PNIF**
   Dette kan være nyttig i forsøk med medisiner eller immunterapi, eller for å vurdere betydningen av miljøfaktorer i hjemmet eller på arbeidsplassen til enkelte pasienter med rhinitt. Sykliske forandringer i nesens åpenhetsgrad kan også undersøkes, likeledes senreaksjoner på allergenprovokasjon.

Normalverdier PNIF

Flere påfølgende målinger som ble utført hos trenede individer, viser en variasjonskoeffesient på omkring 6 %. Nasal åpenhetsgrad varierer over tid, og hos mange individer varierer PNIF med det dobbelte i løpet av dagen. Registreringer etter bruk av avsvellende midler er langt mer ensartede. Det er også mulig å oppnå mer ensartede resultater ved å unngå faktorer som medfører endringer i nesepassasjen, for eksempel romtemperatur og fuktighet, krydrete matvarer, irriterende lukter osv.

Testens nøyaktighet

Nøyaktighet ± 10 % eller 10 l/min (avhengig av hva som er størst), og repeterbarhet på ± 5 l/min.

Rengjøring av In-check

Legg In-check i varmt (men ikke kokende) mildt såpevann i 2-3 minutter (maks. 5 minutter). Beveg måleren frem og tilbake for å være sikker på at den er fullstendig rengjort. Skyll i rent, varmt vann og rist forsiktig for å fjerne gjenværende vann. *Det er viktig å skylle grundig for å forhindre saltflekker på innsiden av hylsen og spindelen. La den torke helt for den brukes på nytt.*
Forventet levetid for In-check ved normal bruk er 2 år.

[1]M.J. Gleeson *et al. Clin. Otolaryngol. 1986.* **11**. 99-107.

⚠ Advarsel:

Som ved alle inhalasjonsapparater er det viktig å kontrollere at det ikke er fremmedlegemer i apparatet før det tas i bruk. In-check er laget av gjennomsiktig materiale slik at det skal være enkelt for brukeren å kontrollere dette for inhalasjon.
For å hindre kvelning, er det viktig å sjekke at det ikke finnes løse deler i apparatet før bruk.

hr

Uvod

Mjerač In-check prenosiv je mjerač inspiracijskog protoka koji služi za mjerenje protoka zraka kroz usta ili nos. Namijenjen je za upotrebu u pacijenata kao jednostavan način praćenja brzina protoka i služi kao izvor vrijednih informacija o stupnju opstrukcije ili restrikcije dišnih puteva. Može se upotrebljavati i za procjenu tehnike upotrebe inhalatornih lijekova.
Prilikom udisanja kroz mjerač In-check dolazi do pomicanja strelice uz ljestvicu koja pokazuje brzinu protoka. Postignuta razina protoka može se zabilježiti označavanjem položaja strelice na kalibriranoj ljestvici.

Primjena

Mjerač In-check može se upotrebljavati za mjerenje maksimalnih ili submaksimalnih brzina inspiracijskih protoka. Prozirno tijelo mjerača omogućuje kvalitativni pregled inspiracijskog manevra.
Za mjerenje nosnog inspiracijskog protoka disanja potrebno je pričvrstiti masku za lice.
Za oralne inspiracijske protoke svakom je pacijentu potrebno staviti čisti nastavak za usta (standardni ili filtarski). In-check je potrebno čistiti u skladu s uputama.
Za poništavanje mjerač In-check držite okomito tako da nastavak za usta bude na vrhu, što vam omogućuje da okrugli kraj mjerača nježno dodirnete rukom odozdo.
Magnetski uteg za poništavanje bit će uklonjen i strelica će se pomaknuti na početni položaj. Kad se to dogodi, preokrenite mjerač kako bi se magnetski uteg pomaknuo na uobičajeni položaj.

Upute

Za smanjivanje rizika od infekcije moguće je upotrijebiti filtar otporan na bakterije/viruse.

a) za maksimalne oralne inspiracijske protoke:
Pacijenta treba zamoliti da:
1. U potpunosti izdahne.
2. Drži mjerač In-check vodoravno te da usnama pritisne nastavak za usta. Za blokiranje nosnica moguće je upotrijebiti kvačice za nos.
3. Naglo i snažno udahne.

Protok bi trebao biti zabilježen i mjerač In-check trebao bi se poništiti kako je prethodno opisano.
Maksimalan protok potrebno je mjeriti triput i zabilježiti najviši rezultat.

b) Za submaksimalne oralne inspiracijske protoke (osposobljavanje za upotrebu inhalatora):
Pacijenta treba zamoliti da:
1. Izdahne.
2. Vodoravno drži mjerač In-check s usnama pritisnutima oko nastavka za usta.
3. Polako i kontrolirano udahne.

Opisanu brzinu protoka moguće je postići ako pacijenta zamolite da snažno udahne.

c) Za maksimalne nosne inspiracijske protoke:
Pacijenta treba zamoliti da:
1. U potpunosti izdahne.
2. Mjerač In-check drži vodoravno te da provjeri da maska za lice čini zrakopraznan prostor oko nosa.
3. Snažno udahne kroz nos.

Maksimalan nosni inspiracijski manevar trebao bi biti kratak i nagao te bi trebao trajati oko jedne sekunde.
Razina protoka trebala bi biti zabilježena i mjerač je potrebno poništiti kako je prethodno opisano.
Test maksimalnog nosnog inspiracijskog protoka potrebno je ponoviti triput, a u pacijentov karton potrebno je zabilježiti najviši rezultat.
Napomena: *Skinuti naočale. Usta moraju biti zatvorena.*
Potrebno je provjeriti da maska za lice čini zrakopraznan prostor oko nosa. Dostupne su maske u različitim veličinama kako bi odgovarale različitim oblicima lica. Masku je potrebno dezinficirati nakon upotrebe na svakom pacijentu kako bi se izbjegao rizik od infekcije.

Mjerenje maksimalnog inspiracijskog protoka

Maksimalni inspiracijski protok (engl. PIF) jedna je od mnogobrojnih vrsta spirometrijskih ispitivanja. PIF se uobičajeno mjeri na velikim spirometrijskim uređajima, stoga se ne prati na uređajima namijenjenima za široku kućnu upotrebu.
Mjerač In-check to omogućuje i daje nam mogućnost boljeg razumijevanja PIF-a.

Primjene mjerenja oralnog inspiracijskog protoka

Mjerenja submaksimalnih inspiracijskih protoka važna su za situacije kada se pacijente osposobljava za ispravnu upotrebu inhalatora. U nedavno provedenim istraživanjima iznesene su vrijednosti ciljanih inspiracijskih protoka za brojne inhalatorne lijekove koji se upotrebljavaju za liječenje bolesti dišnih puteva.
Povratna informacija koju pacijent dobije nakon mjerenja mjeračem In-check omogućuje prilagodbu tehnike udisanja tako da najbolje odgovara njihovu inhalatoru.

Primjene mjerenja maksimalnog nosnog inspiracijskog protoka (engl. PNIF)

1. **Dijagnoza nosne opstrukcije**
   U nekih pacijenata koji se žale na nosnu opstrukciju, otvorenost dišnih puteva normalna je, a do simptoma je došlo zbog neke druge abnormalnosti nosne šupljine kao što je stršeća nosna šoljka. U drugim slučajevima dolazi do iznenađujuće niskih očitavanja u pacijenata koji ne znaju da imaju nosnu opstrukciju jer su se na nju navikli. U takvim slučajevima moguće je postići tiho disanje kroz nos unatoč očitavanju maksimalne brzine nosnog inspiracijskog protoka ispod 50.
   Ti pacijenti često nisu svjesni da uglavnom dišu na usta.
   Mjerenjem PNIF-a nakon primjene nosnog dekongestiva kao što je efedrin u spreju ili kapima može se procijeniti reverzibilnost nosne opstrukcije. Ako takvom terapijom PNIF nije povišen do vrijednosti iznad 100, opstrukcija bi mogla biti povezana s edemom sluznice, polipima ili anatomskom abnormalnošću. Davanje topikalnih ili sistemskih steroida također može normal izirati raspon PNIF-a (100 do 300 L/min).
2. **Procjena reakcije na nosnu provokaciju**
   Primjena alergena ili farmakološkog pokretača alergijske reakcije (npr. histamin) na nosnu sluznicu u dozama koje smanjuju PNIF za pola obično je povezana samo s neznatnom i prolaznom nelagodom. Objavljeni su detalji pojednostavnjenog testa provokacije uz pomoć PNIF-a[1].
3. **Kućno praćenje PNIF-a**
   Ovo može biti korisno u ispitivanjima lijeka ili imunoteraprije za rinitis ili za procjenu važnosti ekoloških čimbenika u kući ili na poslu za pojedine pacijente koji pate od rinitisa. Kliničke promjene u otvorenosti nosnih puteva također se mogu istražiti, kao i zakašnjele reakcije na provokaciju alergenom.

Normalne vrijednosti PNIF

Ponovljena mjerenja iz jednog pokušaja u osposobljenih pacijenata pokazuju koeficijent varijacije oko 6 %.
Otvorenost nosnih puteva s vremenom se mijenja i kod velikog broja normalnih pojedinaca PNIF tijekom dana može se razlikovati za više od dvostruko. Očitavanja nakon primjene dekongestiva dosljedna su, a dosljednost se poboljšava i izbjegavanjem čimbenika povezanih s promjenama u nosnim putevima, kao što su ekstremne vrijednosti sobne temperature ili vlažnost, jako začinjena hrana ili nadražujuće pare itd.

Preciznost izvedbe

Preciznost od ±10 % ili 10 l/min (koja god je vrijednost viša) i ponovljivost od ±5 l/min.

Čišćenje mjerača In-check

Uronite mjerač In-check u toplu (ali ne vruću) otopinu deterdženta na dvije do tri minute (najviše na pet minuta). Pokrenite mjerač za temeljito čišćenje.
Isperite u čistoj toploj vodi i nježno protresite kako biste uklonili višak vode. *Važno je temeljito isprati kako se na unutrašnjosti tijela i vrata ne bi pojavile mrlje.*
Pustite da se temeljito osuši prije ponovne upotrebe.
Očekivani rok trajanja mjerača In-check pri normalnoj upotrebi jest dvije godine.

[1]M. J. Gleeson *et al. Clin. Otolaryngol. 1986*., **11**, 99. – 107.

⚠ Upozorenje:

Kod upotrebe svih inhalatora važno je provjeriti nepričvršćene predmete prije upotrebe uređaja. Prozirni materijal upotrijebljen za izradu uređaja In-check omogućuje korisniku da pregleda uređaj prije udisanja.
Kako biste spriječili gušenje, provjerite da u uređaju nema nikakvih predmeta.

fi

Johdanto

In-check on kannettava sisäänhengityksen virtausmittari, jollamitataan joko suun tai nenän kautta tapahtuvaa sisäänhengitystä. Sen tarkoituksena on auttaa potilasta tarkkailemaan yksinkertaisella tavalla sisäänhengityksensä virtausmääriä, ja se antaa siten arvokasta tietoa ilmatiehyeissä olevan tukkeuman tai rajoituksenmäärästä. Sitä voidaan käyttää myös lääkkeen hengitystekniikan arvioimiseen.
Kun potilas hengittää In-check-mittarin kautta, sisäänhengitysvirtauksen osoitin liikkuu asteikolla. Saavutettu virtausmäärä nähdään tarkistamalla osoittimen asema kalibroidulla asteikolla.

Käyttö

In-check-mittaria voidaan käyttää joko suurimpien tai lähes suurimpien sisäänhengitysvirtausten mittaamiseen. Sen läpinäkyvä runko mahdollistaa sisäänhengityksliikkeen laatutarkkailun.
Nenän kautta tapahtuvan sisäänhengitysvirtauksen mittaamisessa on käytettävä kasvonaamiota.
Suun kautta tapahtuvassa sisäänhengityksessä jokaisen potilaan on käytettävä puhdasta suukappaletta (perus- tai suodatinmallia). In-check on puhdistettava sivun 7 ohjeiden mukaisesti.

Rengöring av In-check

Blötlägg In-check i varmt (men inte hett) vatten med mild tvållösning i 2-3 minuter (högst 5 minuter). För runt mätaren i vattnet så att den blir ordentligt rengjord.
Skölj i rent varmt vatten och skaka försiktigt av kvarvarande vatten. *Det är viktigt att skölja ordentligt för att förhindra up-pkomsten av saltfläckar inne i cylindern och inneraxeln.*
Låt den torka ordentligt innan den används på nytt.
Livslängden för In-check är två år vid normal användning.

[1]M.J. Gleeson *m.fl. Clin Otolaryngol. 1986*, **11**. 99+107.

⚠ Varning:

Vid användning av alla slags inhalatorer är det viktigt att man före användandet kontrollerar att den inte innehåller lösa främmande delar. Det genomskinliga materialet i In-check gör det lättare att kontrollera inhalatorn före användandet.
För att förhindra eventuell kvävningsrisk bör man före användandet alltid kontrollera att inhalatorn inte innehåller lösa främmande delar.

no

Innledning

In-check er en bærbar inspirasjonsstrømmåler for måling av enten oral eller nasal luftpassasje. Den er beregnet på at pasienter enkelt skal kunne måle luftstrømmen, og gir verdifull informasjon om graden av obstruksjon eller restriksjon i luftveiene. Den kan også brukes for å vurdere inhalasjonsteknikken.
Når man puster inn gjennom In-check, vil en markør bevege seg langs en skala og angi inspirasjonsstrømmen. Resultatet fremkommer ved at man leser av markørens posisjon på den kalibrerte skalaen.

Bruksområde

In-check kan brukes til å måle maksimale eller submaksimale inspirasjonsgrader. Den gjennomsiktige utformingen gjør at man kan vurdere inspirasjonen kvalitativt.
For å måle nasal inspirasjon er det nødvendig å bruke ansiktsmaske.
For orale inspirasjonsmålinger må man bruke et rent munnstykke (standard eller filtertype) for hver pasient.
In-check rengjøres i henhold til instruksjonene på s. 7 Når du skal nullstille In-check, holder du apparatet loddrett med munnstykket opp.
Bank forsiktig på den runde enden av måleren fra undersiden. Den magnetiske vekten vil komme ut av stilling, og markøren går tilbake til utgangsposisjonen. Deretter snur du måleren slik at magnetvekten går tilbake til hvilestillingen.

Instruksjoner

Et bakterie-/virusfilter med liten motstand kan brukes for å redusere risikoen for kryssinfeksjon.

a) Målinger av oral PIF (Peak Inspiration Flow):
Be pasienten om å:
1. Puste helt ut
2. Holde In-check vannrett med leppene lukket rundt munnstykket. En neseklemme kan brukes for å stenge neseborene
3. Inhalere fort og kraftig

Inspirasjonsstrømmen noteres og In-check nullstilles som beskrevet ovenfor.
PIF måles tre ganger, og den høyeste verdien registreres i pasientens journal.

b) Målinger av oral submaksimal inspirasjon (inhalasjonstrening):
Be pasienten om å:
1. Puste ut
2. Holde In-check vannrett med leppene lukket rundt munnstykket
3. Inhalere på en rolig og kontrollert måte

Ved å be pasienten inhalere mer eller mindre kraftig får man en beskrivelse av luftstrømmen.

c) Måling av PNIF (Peak Nasal Inspiratory Flow):
Be pasienten om å:
1. Puste helt ut
2. Holde In-check vannrett og kontrollere at ansiktsmasken slutter tett rundt nesen
3. Inhalere kraftig gjennom nesen

PNIF-målingen skal skje ved en kort og kraftig inhalasjon som varer i ca ett sekund.
Inspirasjonsstrømmen noteres, og In-check nullstilles som beskrevet ovenfor.
PNIF-målingen gjentas tre ganger, og den høyeste verdien registreres i pasientens journal.
Merk: *Pasienten må ta av eventuelle briller.*
Munnen må være lukket.
Pass på at ansiktsmasken slutter seg tett til ansiktet. Det finnes masker i forskjellige størrelser beregnet på ulike ansiktsformer.
Masken må desinfiseres mellom hver pasient for å unngå risiko for kryssinfeksjon.

Måling av PIF

PIF (Peak Inspiratory Flow) er én av mange spirometriske målemetoder. PIF måles vanligvis med store spirometre og har derfor ikke vært mye brukt til seriemålinger hjemme. In-check gjør dette mulig og skaper en større forståelse for hva PIF er.

Målinger av oral inspirasjonsstrøm.

Måling av submaksimal inspirasjon er nyttig når man skal lære opp pasienten i riktig bruk av medisinske inhalasjonsapparater. Nyere studier har vist marginale inspirasjonsverdier for mange av de medisinske inhalasjonsapparatene som brukes for tilføring av medisin ved sykdommer i luftveiene.
Tilbakemeldingene som pasientene får ved bruk av In-check, gjør at de lettere kan tilpasse inhalasjonsteknikken etter deres eget inhalasjonsapparat.

Målinger av PNIF (Peak Nasal Inspiratory Flow)

1. **Diagnose av nasal obstruksjon.**
   Hos noen pasienter som klager over tett nese, er luftpassasjen i nesen nærmest normal. Symptomene skyldes bevissthet om andre forhold i nesekaviteten, for eksempel en forstørret nesemusling. I andre tilfeller kan man finne overraskende lave resultater hos pasienter som ikke er oppmerksomme på at de har nasal obstruks jon, fordi de er blitt vant til det. I slike tilfeller kan rolig pusting gjen nom nesen oppnås selv når PNIF er så lav som 50. Slike pasienter er ofte ikke klar over at de puster gjennom munnen store deler av tiden.
   Tilbakegang av nasal obstruksjon kan konstateres ved å måle PNIF etter bruk av et nasalt avsvellingsmiddel, for eksempel efedrin i spray- eller dråpeform. Hvis PNIF-verdien ikke øker til over 100 ved slik behandling, kan obstruksjonen tilskrives slimhinneødem, uttalte polypper eller anatomiske forhold. Lokal eller systematisk kortisonbehandling kan også få PNIF til å ligge innenfor normalområdet (100 til 300 l/min).
2. **Vurdering av respons på nasal prov